



Российская Федерация  
Самарская область

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
НОВОКУЙБЫШЕВСК**

Миронова ул., д. 2, Новокуйбышевск, 446200

Тел./факс (84635) 641-33, 667-09

e-mail: adm@nvkb.ru

<http://www.city-hall.nvkb.ru>

ОКПО 04031486, ОГРН 1026303118841

ИНН/КПП 6330001300/633001001

Исх. № 10848 от «  » 26 ДЕК 2018

На № 38/199 от «19» 12. 2018

Руководителю организации

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

О профилактике  
заболеваемости корью

В целях профилактики заболеваемости корью среди работающего населения и в соответствии с пунктам 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 протокола совещания по вопросу принятия неотложных мер по предупреждению распространения кори на территории Самарской области под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области А.Б. Фетисова от 10.12.2018 г. администрация городского округа Новокуйбышевск информирует Вас о необходимости принятия мер по организации иммунизации против кори лиц до 35 лет, а также лиц от 36 до 55 лет (включительно), относящихся к группам риска (работники медицинских и образовательных учреждений, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом), в том числе трудовых мигрантов в лечебно-профилактических организациях по месту расположения организаций в срок до 29 декабря 2018 года, а также о необходимости ежедневного мониторинга состояния сотрудников на предмет проявления симптомов заболевания.

\*  
025072

С целью выявления симптомов заболевания дополнительно направляем памятку «Все о кори».

Приложение: памятка о кори на 1 л. в 1 экз.

Заместитель  
главы городского округа  
по финансам и экономическому развитию



И.Н. Булгакова

## Все о кори

Корь распространена во всех странах и континентах. Вспышки заболевания наблюдаются каждые 8-10 лет, особенно на фоне нынешней моды отказа от профилактических прививок. С наибольшей частотой подъем заболеваемости происходит с ноября по май. Могут болеть как дети, так и взрослые.

Болезнь имеет несколько периодов:

1. **Инкубационный** – с 8 по 17 день от момента заражения. При введении иммуноглобулина удлиняется до 21 дня.
2. **Катаральный** – характеризуется лихорадкой, интоксикацией, катаральными явлениями (насморк, кашель, конъюнктивит, светобоязнь). Длится 2-4 дня, редко может удлиняться до 6 дней. Уже в это период можно обнаружить коревую энантему на слизистой оболочки неба, а также пятна Бельского-Филатова-Коплика на слизистой полости рта.
3. **Период высыпания.** На фоне лихорадки и катаральных явлений появляется пятнисто-папулезная сыпь на неизменном цвете кожи. Сыпь характеризуется **этапностью** появления. Она спускается с лица на руки в первые сутки, на туловище во второй день и на нижние конечности на 3 сутки. Сыпь имеет тенденцию к слиянию.
4. **Период пигментации.** Слившаяся сыпь меняет окраску, становится «буровой», исчезают катаральные явления, нормализуется температура тела, может появиться шелушение на коже щек. Больной заразен для окружающих в течение 5 дней с момента появления сыпи.

Таким образом, катаральные явления, лихорадка, коревая энантема, пятна Бельского-Филатова-Коплика, пятнисто-папулезная сыпь с тенденцией к слиянию и этапностью высыпания являются основными критериями в клинической диагностике кори.

**Основные осложнения кори:** пневмония, энцефалит, ларингит, поражение кишечника.

Основным методом профилактики был и остается метод вакцинопрофилактики, которая используется во всем мире более 50 лет.